

Le Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Famille : Ardéidés

Statut et Protection

- Directive Oiseaux : Annexe I (code Natura 2000 A023)
- Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code de l'environnement.
- Convention de Berne : Annexe II
- Liste rouge nationale : Espèce à surveiller



Description

Petit héron au corps trapu, à grosse tête engoncée dans les épaules et bas sur pattes.

Plumage des adultes : manteau gris et dossard noir. Dessus de la tête noire, prolongé à la nuque par 2 à 4 longues plumes étroites blanches. Gros œil rouge. Ventre et poitrine dominés par le gris, légèrement nuancé de crème. Plumage des juvéniles : brun rayé de jaunâtre à la tête et au cou, constellé de taches claires allongées sur le corps. En vol, silhouette comprimée caractéristique, cou replié, ailes larges, arrondies lui donnant l'allure d'une grande chouette.

Biologie – Ecologie

Fréquente les abords des cours d'eau naturels ou peu aménagés bordés d'importantes ripisylves, les zones d'étangs peu profonds et les marais doux recouverts d'une importante végétation.

Adeptes de l'affût, ils capturent des petits poissons, mais surtout des amphibiens et leurs têtards, ainsi que des insectes aquatiques et leurs larves. Ils consomment également en moindre quantité des reptiles, des micromammifères, des crustacés et des sangsues.

Ils nichent en colonies dans des bois inondés ou humides. Le bihoreau est fidèle à son site de reproduction. Les colonies peuvent être mono spécifiques ou mixtes. Le Bihoreau s'installe de préférence dans les secteurs les plus ombragés des bois. Le nid est constitué à partir de branchettes entre 2 et 5 m de hauteur. La ponte, généralement de 3 et 4 œufs (extrêmes 2 à 6) est déposée de la fin mars au début de juillet. L'incubation, assurée par les 2 sexes, dure environ 21 jours. Dès l'âge de 10 à 15 jours, les jeunes peuvent se déplacer spontanément hors du nid. L'envol intervient à 4 semaines et l'indépendance à plus de 8 semaines. Les premiers immatures volants sont observés fin juin début juillet.

Principales menaces

Les aménagements ou les entretiens des cours d'eau (coupe des ripisylves, plantations de peupliers, destruction des îles, enrochement, etc.) sont les principales menaces sur les sites de nidification. Le déclin européen est probablement lié également aux conditions d'hivernage en Afrique.

Où et quand le voir sur le bassin de l'Or ?

Le Bihoreau gris est bien présent sur l'étang de l'Or avec un maximum de 60 individus recensés. Aucune colonie de reproduction n'a été recensée à ce jour. Les oiseaux proviennent certainement des colonies de Petite Camargue gardoise.

Données issues du DOCOB « Etang de Mauguio » - 2008