

## Prés salés méditerranéens

Typologie : Prés salés méditerranéens du Juncion maritimi et du Plantaginion crassifoliae  
Surface : 700 ha

### *Statut et Protection*

→ Directive habitats : Annexe I (Code Natura 2000 1410-1 et 1410-2)



### *Description générale de l'habitat*

Cet habitat regroupe l'ensemble des végétations méditerranéennes pérennes des basses et hautes terres plus ou moins salées et soumises à inondation hivernale. La végétation herbacée, moyenne à haute, est de type prairial. Elle est parfois dominée floristiquement et physionomiquement par les glumiflores (graminées, cypéracées et joncacées).

Ces prés se développent dans les zones de vases salées à marnage plus ou moins important, en bordure des marais côtiers et des étangs lagunaires, sur substrat sablo-limoneux (15.53/55) à limono-vaseux (15.51/52- 57). Le niveau d'engorgement et la salinité du substrat peuvent varier fortement selon la position topographique et le niveau d'assèchement estival.

### *Caractéristiques de l'habitat sur le site*

Cet habitat générique d'intérêt communautaire englobe différents faciès de végétation :

- **les hautes jonchaies** du Juncion maritimi sur sols humides à inondés qui tendent à se dessaler en hiver et à subir des remontées salines en périodes sèches.
- **les basses jonchaies et cariçaiés** du Juncion maritimi : mêmes conditions écologiques mais en conditions plus douces. Végétation plus basse, maintenue généralement par pâturage ou par fauche.
- **les prairies méditerranéennes halo-psammophiles** du Plantaginion crassifoliae occupant les substrats sableux des dunes proches des lagunes et s'accommodant des sols secs et durs. Ces prairies ont une physionomie très variable ; ainsi, on observe des zones très ouvertes et basses à Plantain et Germandrée et d'autres plus denses et hautes à Spartine, Choin et Jonc aigu.
- **les prés salés méditerranéens à Puccinellia** dans les bas fonds salés, mais légèrement moins qu'au niveau des fourrés à salicornes, et inondables avec la Puccinellie et l'Aerulope qui dominant en compagnie de l'Inule faux-crithme qui fait la transition avec la sansouire.
- **les prés salés à Chiendent** : Végétation riche en espèces qui s'établit sur les terres plus hautes où subsistent encore des traces de chlorures et qui sont mouillées en hiver et se dessèchent en été. [Chiendent rampant, Trèfle maritime, Pâquerette vivace, Betterave maritime, Jonc aigu, Laïche divisée, Saladelle de Narbonne]
- **les prés salés à Jonc subulé** : végétation pauvre en espèces qui s'établit dans des conditions salées proches des faciès à Puccinellia, souvent rencontrées dans les zones anciennement dégradées des fourrés halophiles où le niveau d'engorgement peut être important.

Données issues du DOCOB « Etang de Mauguio » - 2008