

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

Famille : Motacillidés

Statut et Protection

- Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code de l'environnement.
- Liste rouge nationale : Préoccupation mineure



© Simon Baudouin

Description

La famille des bergeronnettes se caractérise par un corps élancé terminé par une longue queue. Le bec est toujours pointu.

Chez la bergeronnette printanière, en période nuptiale, le mâle se pare de magnifiques plumes jaunes-citron sur le dessous du corps. La tête grise est surmontée d'un long sourcil blanc. La femelle reste plus terne, c'est donc elle qui s'occupera de la couvaison. Le mâle trop coloré pourrait attirer les prédateurs.

Biologie – Ecologie

Après avoir passé l'hiver en Afrique, la bergeronnette s'installe dans les marais et les prairies humides des bords d'étang. Le nid construit par la femelle sera placé au sol, caché par la végétation. Pendant la phase de nidification, le couple défendra farouchement son territoire contre ses congénères.

Grace à son bec long et fin, elle pourra capturer toute sorte d'insectes, de larves et de mollusques. Dès le mois de septembre certains individus vont quitter l'Europe et débiter leur retour vers l'Afrique.

Principales menaces

Peu de menaces pèsent sur cet oiseau.

Où et quand le voir sur le bassin de l'Or ?

La bergeronnette des ruisseaux est présente d'avril à septembre, dans les milieux herbeux ouverts souvent à proximité de l'eau.