

Glaréole à collier

Glareola pratincola

Famille : Glaréolidés

Statut et Protection

- Directive Oiseaux : Annexe I (Code Natura 2000 A135)
- Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code de l'environnement.
- Convention de Berne : Annexe II
- Convention de Bonn : Annexe II
- Liste rouge nationale : Espèce localisée



Description

Ressemble à une sterne sombre par ses ailes pointues et sa queue fourchue. Dos et ailes brun clair, ventre et croupion blanc. Dessous des ailes rouge bordeaux. Gorge jaunâtre bordée de noir. Vol rapide et vif.

Biologie – Ecologie

Les principaux habitats fréquentés sont les lagunes, les deltas et les estuaires. L'espèce se cantonne essentiellement dans les prés salés, les marais d'eau douce pâturés et les salins. Le pâturage extensif (manade) est très apprécié.

Bien que la Glaréole soit classée dans les échassiers, elle capture des insectes (Coléoptères, mouches, libellules, araignées, criquets) en vol à la manière d'une hirondelle ou d'un martinet. Elle capture également des insectes au sol en se déplaçant rapidement.

La nidification commence avec la prospection des sites favorables à la fin avril. La Glaréole forme en générale des colonies lâches. Le nid se situe à terre dans une cuvette naturelle ou dans une empreinte de taureau ou de cheval. La ponte comprend 1 à 3 œufs et intervient à la mi-mai. L'incubation dure 20 jours et l'élevage dure 1 mois environ.

Principales menaces

Les principales causes du déclin des Glaréoles en France sont la perte des habitats naturels de nidification et d'alimentation par le drainage des zones humides, la mise en culture ou l'aménagement touristique et industriel du littoral ; les changements dans la gestion du bétail qui occasionnent régulièrement la destruction des nids ; la gestion non adéquate des niveaux d'eau sur les sites de nidification noyant les couvées ; l'utilisation massive d'insecticide pour la démoustication qui tue les espèces proies de l'espèce.

Où et quand le voir sur le bassin de l'Or ?

La Glaréole à collier fréquente principalement les prés salés du pourtour de l'étang de l'Or en période de reproduction. L'étang de l'Or est l'un des rares sites de nidification de l'espèce en France avec la Camargue et la Petite Camargue gardoise.

Données issues du DOCOB « Etang de Mauguio » - 2008