

Pipit rousseline

Anthus campestris

Famille : Motacillidés

Statut et Protection

- Directive Oiseaux : Annexe I (Code Natura 2000 A255)
- Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code de l'environnement.
- Convention de Berne : Annexe II
- Liste rouge nationale : Espèce à surveiller



Description

Passereau marcheur et coureur typique des milieux ouverts (dunes, pelouses...), il se caractérise par sa grande taille et sa longue queue qui le fait ressembler à une grosse Bergeronnette. Sa coloration globalement beige-grisâtre qui lui sert de camouflage est typique, de même que l'absence quasi constante de stries sur la poitrine. La tête est prolongée par un grand bec long et rose-orangé et surmontée d'un large sourcil blanchâtre contrastant avec le reste de la tête chamois.

Biologie – Ecologie

Cet oiseau insectivore niche dans les milieux divers pourvu qu'ils soient ouverts, secs, ensoleillés, et que le terrain soit en partie nu. Il fréquente aussi bien les dunes littorales, les sansouires, les pelouses pâturées, les landes à thym, les garrigues dégradées. Aucune étude précise concernant son régime alimentaire n'a été réalisée en France. Il est probable qu'il se nourrisse de l'ensemble des cortèges d'insectes vivant dans les secteurs méditerranéens : libellules, sauterelles, mantes, adultes et des larves de papillons, mais aussi des Hémiptères, des Hyménoptères... La plupart des nicheurs s'installent en avril en Camargue et vers la fin mai en Charente-Maritime sur les milieux dunaires. Chaque couple occupe un territoire assez étendu de 4 à 12 ha. Le nid est construit principalement par la femelle. Il est en général caché dans une dépression du sol ou à l'abri d'une broussaille. La ponte, de 4 à 6 œufs, est déposée à la fin mai et en juin, l'incubation dure de 12 à 14 jours, les jeunes nourris par les deux parents quittent le nid au bout de 2 semaines mais ne deviennent indépendants qu'au bout de 4 ou 5 semaines. Les secondes nichées sont rares.

Principales menaces

Les menaces principales pour cette espèce sont principalement la fréquentation très importante du milieu dunaire dès le mois de juin et tout le long de la période estivale occasionnant des dérangements importants, la fermeture des milieux dunaires (boisement et plantation de pins). L'espèce n'est pas menacée dans les prés salés, sauf éventuellement par des changements d'occupation du sol (conversion prés salés en cultures).

Où et quand le voir sur le bassin de l'Or ?

L'espèce niche dans les milieux secs du pourtour de l'Etang de Mauguio, prés salés, secteur de l'aéroport de Fréjorgues, milieux dunaires du Grand Travers. Au total c'est une vingtaine de couples qui s'y reproduit.

Données issues du DOCOB « Etang de Mauguio » - 2008